

COVID-19 兒童疫苗

家長/監護人需要瞭解的重要事項

6 個月及以上的人群均可以接種 COVID-19 疫苗。

兒童為何應接種疫苗？

自疫情開始以來，美國已有超過 1300 萬兒童感染了 COVID-19。由於新的 COVID-19 變種病毒的激增，導致青少年因感染 COVID-19 而住院的比率現已達到峰值。

臨床試驗證明，這款疫苗在預防青少年感染 COVID-19 方面具有出色的效果。在接種疫苗後，兒童因 COVID-19 罹患重症、住院或身故的幾率會大大降低。

查看此 [談論疫苗指南](#)，可瞭解有關如何與青少年及其家庭就疫苗進行對話的建議。

如何讓孩子接種疫苗？

華盛頓州為 18 歲以下的兒童免費提供所有推薦的疫苗。您可洽詢孩子的兒科醫生或普通診所，能否為兒童接種 COVID-19 疫苗。

沒有醫療服務提供者的家庭現在可以撥打 **1-800-322-2588** 致電 **Help Me Grow WA Hotline** 或造訪 **ParentHelp123.org** 尋找合適的醫療服務提供者、診所或其他醫療資源。本服務免費，並且可以提供語言協助服務。

您還可造訪 VaccineLocator.doh.wa.gov，透過篩選查找您附近的兒童疫苗接種地點清單。

接種疫苗對於在家中的兒童有何幫助？

COVID-19 疫苗可保護兒童免於染疫，這即表示在舉辦室內聚會時，孩子接受託管或看護將更加安全。

接種疫苗將有效協助孩子保持安全，並保護家中的家庭成員。

家庭應繼續遵循建議的其他安全措施，以實現最佳防護效果。



兒童應接種多少劑疫苗？

建議所有兒童至少接種 2 劑疫苗。可能會建議增加劑次，以便考慮接種最新的疫苗。



- 6 個月至 4 歲的兒童接種 3 劑次的 Pfizer 初始系列疫苗或 2 劑次的 Moderna 初始系列疫苗
- 5 至 11 歲的兒童接種 2 劑次的初始系列疫苗
- 12 至 17 歲的兒童接種 2 劑次的初始系列疫苗



接種過 2 劑系列疫苗且為中度或重度免疫功能低下的兒童，應在第 2 次接種疫苗滿 28 天後接種額外的初始劑次疫苗，並且所有 5 歲以上的兒童應接種一劑加強針劑。將來可能會建議其他群體接種額外針劑疫苗。

如需解答您的疑問：

請造訪：VaccinateWA.org/kids

請致電：1-833-VAX-HELP(1-833-829-4357)，按 #
我們提供語言協助服務。

COVID-19 是否真的會對孩子造成風險？

儘管兒童感染 COVID-19 的人數少於成人，但兒童可能會：

- 感染導致 COVID-19 的病毒
- 因 COVID-19 生病或死亡
- 將 COVID-19 傳染給他人
- 因 COVID-19 而發生嚴重併發症，例如「COVID 長期慢性症候群」或危險的炎性疾病 MIS-C（兒童多系統炎症症候群）

研究表明，疫苗對兒童群體的副作用較小，且可有效保護兒童染病。接種疫苗的好處遠大於感染 COVID-19 所產生的風險。

疫苗對我的孩子是否安全？

是的，目前認為疫苗對兒童非常安全。在對青少年進行的疫苗臨床試驗中，未發現嚴重副作用。目前正在開展相關研究，而且美國擁有非常強大的疫苗安全系統，可以及早發現任何預警跡象。

兒童接種疫苗會有哪些常見副作用？

如果兒童感染 COVID-19，所產生的健康風險遠遠高於疫苗副作用所帶來的風險。

與其他疫苗一樣，最常見的副作用包括手臂酸痛、疲勞、頭痛和肌肉疼痛。這些症狀通常非常輕微。

根據報告，[在臨床試驗中](#)（僅英文內容），兒童在接種第二劑後發生副作用的風險要高於接種第一劑後。副作用的嚴重程度一般為輕度到中度，通常在接種疫苗後兩天內出現，大多數副作用的症狀會在一到兩天內消失。

兒童在赴診時，需要攜帶什麼？

在大多數情況下，18 歲以下者接種疫苗時，需要獲得父母和監護人的同意。如需瞭解需要如何給予同意授權，父母和監護人可諮詢疫苗接種地點。

診所可能會要求出示孩子的身份證、保險卡或 Social Security number（社會安全號），但您無需向他們提供。

即使孩子並非美國公民，也可接種疫苗。疫苗接種地點不得詢問任何人的移民身份。個人資料將僅用於公共衛生用途。

我還有其他問題。我透過哪種途徑可以找到答案？

請造訪 [VaccinateWA.org/kids](https://www.vaccinatewa.org/kids)，查找更多問題的解答。您還可向孩子的常規醫療保健提供者諮詢。