

COVID-19 治療 快速指南

COVID-19 的治療類型	接觸前預防	單克隆抗體	口服抗病毒藥物	靜脈輸注抗病毒藥物
現有療法	Evusheld	Bebtelovimab	Lagevrio (molnupiravir) Paxlovid	VEKLURY (remdesivir)
適用於哪些人群？	<p>滿足下列條件的成人和兒童患者（至少年滿 12 歲及以上，且體重至少達到 40 千克）：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 目前未感染 SARS-CoV-2 (COVID-19)。 • 近期無已知接觸 SARS CoV-2 (COVID-19) 感染者。 • 免疫力中重度低下。 • 不建議接種 COVID-19 疫苗。 	<p>滿足下列條件的成人和兒童患者（至少年滿 12 歲及以上，且體重至少達到 40 千克）：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 具有惡化為 COVID-19 重症的較高風險，包括住院或死亡。 	<p>Paxlovid:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 成人和兒童患者（年滿 12 歲及以上，且體重至少達到 40 千克）。 <p>Lagevrio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 具有惡化為 COVID-19 重症的較高風險的成人，包括住院或死亡。 • 不建議接受 COVID-19 替代治療方案或無法獲得其他 COVID-19 治療方案的成人。 	<p>滿足下列條件的成人和兒童患者（至少年滿 12 歲及以上，且體重至少達到 40 千克）：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 目前住院 • 未住院且無惡化為 COVID-19 重症的高風險，包括住院或死亡。 <p>滿足下列條件且體重為 3.5 千克至 40 千克以下的兒童患者或年齡在 12 歲以下、體重至少為 3.5 千克的兒童患者：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 目前住院 • 未住院且無惡化為 COVID-19 重症的高風險，包括住院或死亡。
何時接受治療？	接種疫苗滿 2 週後	COVID-19 檢測結果呈陽性後 7 天或更短時間內	COVID-19 檢測結果呈陽性後 5 天或更短時間內	COVID-19 檢測結果呈陽性後 7 天或更短時間內
如何接受治療？	醫療服務提供者	醫療服務提供者	醫療服務提供者、當地藥房	住院醫療機構

請造訪：hhs.gov，瞭解更多資訊



DOH 825-035 May 2022 Traditional Chinese

若您需要本文件的其他格式，請致電 1-800-525-0127。失聰或聽障者客戶，請致電 711 (Washington Relay) 或傳送電郵至 civil.rights@doh.wa.gov。