

COVID-19 疫苗加强针剂

2021 年 11 月 9 日更新

某些 COVID-19 疫苗接种者可以接种加强针

- 65 岁及以上人群、50-64 岁的基础疾病患者或 18 岁以上的长期护理机构住户，如果已接种初始 mRNA COVID-19 疫苗针剂（可能包括中度至重度免疫功能低下者的额外初始针剂），则**应该**在完成初始针剂后至少 6 个月接种加强针剂。
- 18-49 岁的基础疾病患者或在高风险环境中工作或生活的 18 岁及以上人群，如果已接种初始 mRNA COVID-19 疫苗针剂（可能包括中度至重度免疫功能低下者的额外初始针剂），则**可以**在完成初始针剂后至少 6 个月接种加强针剂。
- 已接种强生/杨森 COVID-19 疫苗的 18 岁及以上人群**应该**在接种初始疫苗针剂后至少 2 个月接种加强针剂。

如果您接种了

辉瑞-生物科技或莫德纳

如果您满足以下条件，则可接种加强针：

- [65 岁或以上](#)
- 18 岁以上的[长期护理机构](#)住户
- 18 岁以上的[基础疾病](#)患者
- 18 岁以上的[高风险环境](#)工作人员或住户

何时接种加强针：

完成 COVID-19 免疫接种初始针剂后至少 6 个月

您应接种哪种加强针？

在美国已获得授权的[任何 COVID-19 疫苗](#)

选择您的 COVID-19 加强针

您可以选择接种哪种 COVID-19 疫苗作为加强针。有些人可能偏好其初始接种的疫苗类型，而其他人可能偏好接种不同的疫苗作为加强针。CDC 如今的建议允许加强针混合疫苗类型。

了解如何[查找您附近的 COVID-19 疫苗](#)。

如果您接种了

辉瑞-生物科技或莫德纳 COVID-19 疫苗

65 岁及以上的老年人

65 岁及以上的群体**应**接种加强针。COVID-19 重病高风险[随着年纪的增加而增加](#)，而对于患有基础疾病的任何年龄段成年人，重病风险也增加。

18 岁及以上的长期护理设施住户

如果您接种了

强生公司的 Janssen

如果您满足以下条件，则可接种加强针：

[18 岁或以上](#)

何时接种加强针：

完成接种至少 2 个月后

您应接种哪种加强针？

在美国已获得授权的[任何 COVID-19 疫苗](#)

18岁及以上的长期护理设施住户**应**接种加强针。因为[长期护理环境](#)中的住户在群体环境中紧密居住且通常为患有基础疾病的老年人，他们面临 COVID-19 更高的感染风险和重病风险。

50-64 岁患有基础疾病的群体

50-64 岁患有基础疾病的群体**应**接种加强针。COVID-19 重病风险随着年龄的增加而增加，而对于患有[基础疾病](#)的任何年龄段成年人来说风险也更高。

18-49 岁患有基础疾病的群体

18-49 岁患有基础疾病的群体根据其个人风险和益处情况**可以**接种加强针。COVID-19 重病风险对于患有[基础疾病](#)的任何年龄段成年人都更高。随着未来更多数据可用，本建议未来可能改变。

18-64 岁的高风险工作环境工作人员或住户

由于[职业或机构环境](#)而面临 COVID-19 接触和传播高风险的 18-64 岁人群**可以**根据自身个人风险和益处接种加强针剂。在某些环境中（例如医疗、学校、惩教设施、无家可归者收容所）工作或居住的成年人可能面临 COVID-19（可能在其工作或居住的地方传播）接触高风险。这种风险可能因环境及社区 COVID-19 传播程度的不同而异。随着更多数据可用，本建议未来可能改变。

可以接种 COVID-19 加强针的工作人员示例：^[1]

- 急救人员（如健康护理人员、消防员、警察、集体护理人员）
- 教育工作者（如教师、辅助人员、日间看护人员）
- 食品和农业工作人员
- 制造业工作人员
- 惩教工作人员
- 美国邮政服务工作人员
- 公共交通工作人员
- 百货店工作人员

¹本列表未来可能更新。

如果您接种了

强生/杨森 COVID-19 疫苗

至少在 2 个月前接种过强生/杨森 COVID-19 疫苗的 18 岁及以上人群**应该**接种加强针剂。与两剂型疫苗相比，单剂的强生/杨森 COVID-19 疫苗的疫苗效力较低。

您的免疫接种卡和加强针

在您第一次预约免疫接种时，您应该收到了 [CDC 的 COVID-19 免疫接种记录卡](#)，告知您接种的 COVID-19 疫苗种类、接种日期和接种地点。请在加强针免疫接种时携带您的免疫接种记录卡。

如果您在第一次预约时未收到 CDC 的 COVID-19 免疫接种记录卡，请联系为您接种第一剂疫苗的免疫接种点或您所在[州的卫生部门](#)，了解如何获得免疫接种记录卡。