



以下信息节录自 CDC 官方网站，所有内容均以官方网站公布信息为准。

网站链接: <https://chinese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html>

COVID-19 免疫接种后报告的特定不良反应

2021 年 3 月 9 日更新

COVID-19 疫苗的安全性

监测工作的结果可靠放心。有些人没有任何副作用。许多人报告在 COVID-19 免疫接种后出现轻微副作用。

疫苗是否的安全? (詳見網址: <https://chinese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html>)

您需要了解的信息

- COVID-19 疫苗是安全且有效的。
- 美国已有数百万人接种了 COVID-19 疫苗，并且这些疫苗将接受美国历史上最严格的安全监测。
- CDC 建议您在符合接种条件后立即接种 COVID-19 疫苗。
- 本页所述不良反应已向疫苗不良反应报告系统 (VAERS) 报告。
- VAERS 接受疫苗接种后任何不良反应的报告，即使目前尚不清楚疫苗如何引起问题。
- CDC、FDA 和其他联邦合作伙伴将持续监测 COVID-19 疫苗的安全性。

严重过敏反应和死亡报告

- COVID-19 免疫接种后的严重过敏反应非常少见。如果出现这种情况，免疫接种提供者可以立即有效地治疗这类反应。
- 截至目前，VAERS 尚未在死亡原因中发现表明 COVID-19 疫苗存在安全问题的模式。

COVID-19 免疫接种后的严重过敏反应

- COVID-19 免疫接种后的严重过敏反应非常少见。如果出现这种情况，免疫接种提供者可以立即有效地治疗这类反应。
- 截至目前，VAERS 尚未在死亡原因中发现表明 COVID-19 疫苗存在安全问题的模式。

接种疫苗后可能会发生严重的过敏反应，包括过敏性反应（詳見網址：<https://chinese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/allergic-reaction.html>）。

COVID-19 免疫接种后的严重过敏反应非常少见。如果出现这种情况，免疫接种提供者可以立即有效地治疗这类反应。

CDC 和 FDA 的科学家对人们在接种 COVID-19 疫苗后发生严重过敏反应的报告进行了评估。根据向 VAERS 报告的事件，在 COVID-19 免疫接种后发生过敏反应的情况很罕见，在美国每百万接种者中约有 2 至 5 人发生。这种过敏反应几乎都是在接种疫苗后 30 分钟内发生。幸运的是，疫苗接种提供者拥有药物，可有效和立即治疗接种后出现过敏反应的患者。了解有关 COVID-19 疫苗和过敏反应的更多信息。

COVID-19 免疫接种后死亡的报告

- FDA 要求疫苗接种提供者向 VAERS 报告 COVID-19 免疫接种后的死亡情况。
- 免疫接种后 VAERS 报告的死亡并不一定意味着疫苗导致了死亡。
- CDC 会跟进所有死亡报告，要求提供更多信息，了解更多发生的情况，并确定死亡是由疫苗引起还是与疫苗无关。
- 截至目前，VAERS 尚未在死亡原因中发现表明 COVID-19 疫苗存在安全问题的模式。
- CDC、FDA 和其他联邦合作伙伴将持续监测 COVID-19 疫苗的安全性。

从 2020 年 12 月 14 日至 2021 年 3 月 8 日，美国接种了超过 9200 万剂 COVID-19 疫苗。在此期间，VAERS 在接种 COVID-19 疫苗的人中收到了 1,637 例死亡报告（0.0018%）。CDC 和 FDA 医生会在接到报告后立即审查每一个死亡病例报告，CDC 要求提供医疗记录以进一步评估报告。对包括死亡证明、尸检和医疗记录在内的现有临床资料的审查显示，没有证据表明免疫接种会导致患者死亡。CDC 和 FDA 将继续调查向 VAERS 报告的不良反应报告（包括死亡）。

您是否在 COVID-19 免疫接种之后出现了副作用？
您可以向 VAERS 报告您的情况。

更多信息

免疫接种咨询委员会（ACIP）：COVID-19 疫苗安全性，更新于 2021 年 1 月（幻灯片集） [1.19 MB, 56 页]（詳見英文網址：

<https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-01/06-COVID-Shimabukuro.pdf>)