

接種 COVID-19 疫苗

**Vaccinate
WA**
CovidVaccineWA.org

抗擊疫情十分艱難，但現在我們有兩種疫苗可以保護我們免受 COVID-19 感染。



兩種疫苗均免費提供。

聯邦政府將為您支付疫苗費用。相關機構不應向您收取費用或開具帳單。如果您只是去診所接種疫苗，您的提供者也不應該向您收取費用。



您將需要接種兩劑疫苗。

您將接種兩劑疫苗，期間間隔三到四周。



兩種疫苗均安全有效。

疫苗的有效性為 94% 到 95%。U.S. Food and Drug Administration (FDA, 美國食品和藥物管理局) 批准了疫苗的緊急使用授權，並沒有發現嚴重的安全問題。獨立專家證實，疫苗符合高安全性和有效性標準。



高危人群將會首先接種疫苗。

隨著我們獲得更多的疫苗，更多的人將能夠接種疫苗。Department of Health (衛生部) 選出將首先接種疫苗的人群，並重點選擇高危人群。當我們有足夠的疫苗劑次時，每個人都可以接種疫苗。造訪 [FindYourPhaseWA.org](https://www.findyourphases.org) 或致電 1-800-525-0127，然後按 # 來瞭解您接種疫苗的時間。(如需口譯服務，請在電話接通時說明您使用的語言。)



您可能會感到副作用。

像其他常規疫苗一樣，接種疫苗後您可能會手臂酸痛、發燒、頭痛或疲勞。這些都是疫苗正在起作用的跡象。



保持安全。

接種疫苗後，戴上口罩，保持 6 英尺 (2 米) 的距離，並為了沒有接種疫苗的人堅持小規模的聚會。

有問題？請造訪：www.CovidVaccineWA.org

接種 COVID-19 疫苗

提供什麼疫苗？

我們提供兩種疫苗：

1. Pfizer-BioNTech
2. Moderna

兩種疫苗均獲得 FDA 的緊急使用授權批准。Advisory Committee for Immunization Practices 和 Western States Scientific Safety Review Workgroup 的醫學專家確認，疫苗符合我們的安全標準。

誰應該接種 COVID-19 疫苗？

您可以選擇是否接種疫苗。如果您決定接種，如有以下情況，您應該告訴您的疫苗提供者：

- 有嚴重過敏反應史
- 發燒
- 有出血障礙或服用血液稀釋劑
- 免疫系統受損或正在服用影響免疫系統的藥物
- 已懷孕、計畫懷孕或處於哺乳期
- 接種過其他 COVID-19 疫苗

如果您對之前接種的 COVID-19 疫苗或疫苗中的任何成分有嚴重過敏反應，則您不應該接種疫苗。

疫苗含有活性成分、信使核糖核酸 (mRNA)，以及脂肪、鹽和糖，以保護 mRNA 並幫助其在體內更好地工作。

您必須年滿 16 歲才能接種 Pfizer-BioNTech 疫苗，年滿 18 歲才能接種 Moderna 疫苗。

有哪些副作用？

接種疫苗後一到三天出現副作用屬常見現象。常見的副作用有疲勞、肌肉疼痛、接種手臂疼痛、發燒、頭痛、關節疼痛、寒戰、噁心或嘔吐。如果您的症狀沒有消失，請聯絡您的醫生或診所。

您應該等 15 到 30 分鐘後再離開接種地點，這樣如果您確實有過敏反應或其他副作用，疫苗提供者就可以幫助您。在等待期間，您可以註冊 v-safe 以報告任何副作用，並獲得第二劑疫苗提示：vsafe.cdc.gov（僅提供英文版）。

您或您的疫苗提供者也可以向疫苗不良事件報告系統 (VAERS) 報告副作用：vaers.hhs.gov/reportevent.html（僅提供英文版）。

如果離開診所後出現過敏反應，請撥打 911。過敏反應症狀包括：呼吸困難、面部和喉嚨腫脹、心跳加快、全身出現嚴重皮疹、頭暈和虛弱。

接種疫苗後會發生什麼？

預約第二劑疫苗。您需要三到四周後再返回接種第二劑疫苗。第二劑次最多可能需要兩周的時間才能發揮充分保護作用。

許多人要等待幾個月才能接種疫苗。接種疫苗後，請繼續佩戴口罩，保持 6 英尺（2 米）的距離，並堅持小規模集會以保護尚未接種疫苗的人。