

Washington State Department of Health

疫苗加強劑量

Chinese, Traditional - 繁體中文 ▾

5 歲及以上完全接種 COVID-19 疫苗的人群可接種加強針。

內容最後更新於日期：2022年5月20日

Centers for Disease Control and Prevention (CDC · 疾病控制與預防中心) 以及 Western States Scientific Safety Review Workgroup (西部各州科學安全審查工作組) 建議 5 歲及以上，接種過 Johnson & Johnson, Pfizer, 或 Moderna COVID-19 疫苗的人群接種加強針。

如果您接種的是.....	誰應該接種加強針	何時接種加強針	接種哪種加強針	我可以接種第二劑加強針嗎？
Pfizer-BioNTech	5 歲及以上的人群	在完成初始劑次接種後至少滿 5 個月	首選 Pfizer 或 Moderna* 17 歲及以下的人群僅可接種 Pfizer 疫苗	50 歲以上的人群，以及某些 <u>免疫功能低下的人群</u> ，如果距離上一次接種加強針已經過去 4 個月或更長時間，現在則可以再接種一劑 mRNA COVID-19 疫苗的加強針。
Moderna	18 歲及以上的人群	在完成初始劑次接種後至少滿 5 個月	首選 Pfizer 或 Moderna*	50 歲以上的人群，以及某些 <u>免疫功能低下的人群</u> ，如果距離上一次接種加強針已經過去 4 個月或更長時間，現在則可以再接種一劑 mRNA COVID-19 疫苗的加強針。
Johnson & Johnson	18 歲及以上的人群	在完成初始劑次接種後至少滿 2 個月	首選 Pfizer 或 Moderna*	50 歲以上的人群，以及某些 <u>免疫功能低下的人群</u> ，如果距離上一次接種加強針已經過去 4 個月或更長時間，現在則可以再接種一劑 mRNA COVID-19 疫苗的加強針。 至少在 4 個月之前接種過 Johnson & Johnson 的 Janssen COVID-19 疫苗的初始疫苗和加強針的成年人，現在可以接種使用 mRNA COVID-19 疫苗的第二劑加強針

* 首選 mRNA 疫苗，但若您無法或不願接種另一種疫苗，則依然可接種 Johnson & Johnson COVID-19 疫苗。

常見問題