

Washington State Department of Health

疫苗加强剂量

Chinese, Simplified - 简体中文 ▾

5岁及以上完全接种 COVID-19 疫苗的人群可接种加强针。

内容最后更新时间：2022年5月20日

Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 疾病控制与预防中心) 以及 Western States Scientific Safety Review Workgroup (西部各州科学安全审查工作组) 建议 5 岁及以上, 接种过 Johnson & Johnson, Pfizer, 或 Moderna COVID-19 疫苗的人群接种加强针。

如果您接种的是.....	谁应该接种加强针	何时接种加强针	接种哪种加强针	我可以接种第二剂加强针吗?
Pfizer-BioNTech	5岁及以上的人群	在完成初始剂次接种后至少满5个月	首选 Pfizer 或 Moderna* 17岁及以下的人群仅可接种 Pfizer 疫苗	50岁以上的人群, 以及某些免疫功能低下的人群, 如果距离上一次接种加强针已经过去4个月或更长时间, 现在则可以再接种一剂 mRNA COVID-19 疫苗的加强针。
Moderna	18岁及以上的人群	在完成初始剂次接种后至少满5个月	首选 Pfizer 或 Moderna*	50岁以上的人群, 以及某些免疫功能低下的人群, 如果距离上一次接种加强针已经过去4个月或更长时间, 现在则可以再接种一剂 mRNA COVID-19 疫苗的加强针。
Johnson & Johnson	18岁及以上的人群	在完成初始剂次接种后至少满2个月	首选 Pfizer 或 Moderna*	50岁以上的人群, 以及某些免疫功能低下的人群, 如果距离上一次接种加强针已经过去4个月或更长时间, 现在则可以再接种一剂 mRNA COVID-19 疫苗的加强针。 至少在4个月之前接种过 Johnson & Johnson 的 Janssen COVID-19 疫苗的初始疫苗和加强针的成年人, 现在可以接种使用 mRNA COVID-19 疫苗的第二剂加强针

* 首选 mRNA 疫苗, 但若您无法或不愿接种另一种疫苗, 则依然可接种 Johnson & Johnson COVID-19 疫苗。

常见问题