



**免责声明：**本网站持续更新。在所有内容翻译完成之前，其中一些内容可能以英文显示。

## 适合儿童和青少年的COVID-19疫苗建议

2022年6月19日更新

### 您需要了解的信息

- CDC建议**所有6个月及以上的人群**接种COVID-19疫苗。
- 所有5岁及以上人群还应在满足条件时接种COVID-19加强针。
- 使用**CDC的COVID-19加强针工具**了解您的儿童或青少年是否可以接种加强针及何时接种加强针，以保持COVID-19疫苗最新免疫接种状态。

## COVID-19疫苗剂量取决于接种当天的接种者年龄，而非体型或体重

儿童接种的COVID-19疫苗剂量应符合其年龄段的剂量要求，少于青少年和成年人的剂量。

### 儿童和青少年的COVID-19初始系列免疫接种

儿童年龄	辉瑞-生物科技	Moderna	强生/杨森
6个月至4岁	3剂初始系列疫苗	2剂初始系列疫苗	未经授权
5岁	2剂初始系列疫苗	2剂初始系列疫苗	未经授权
6-17岁	2剂初始系列疫苗	未经授权	未经授权

如需详细了解适用于儿童和青少年的COVID-19疫苗和剂量，请访问：

- [辉瑞-生物科技COVID-19疫苗概述和安全性](#)
- [莫德纳COVID-19疫苗概述和安全性](#)

如需详细了解适用于免疫功能低下儿童的初始系列疫苗额外剂量，请访问[适用于中度或重度免疫功能低下者的COVID-19疫苗](#)。

详细了解[COVID-19疫苗加强针](#)接种建议。

## 曾经感染过COVID-19的儿童和青少年仍应接种疫苗

最新证据表明，人们可以在感染COVID-19致病病毒后通过接种疫苗获得额外的保护。即使儿童感染了COVID-19，他们仍应接种疫苗。对于已感染COVID-19的儿童，下一剂接种时间需要推迟到自症状开始起的3个月后，如果没有症状，则从检测呈阳性后开始推迟。初始系列针剂或加强针也可能出现推迟情况。

查看关于[通过COVID-19感染和免疫接种获得免疫性的科学事实](#)。

## 同一次就诊时可同时接种COVID-19疫苗与其他疫苗

儿童和青少年可以同时接种COVID-19疫苗和其他疫苗，包括流感疫苗。